

Allopurinol 用藥指導單張

★英文商品名：Allopurinol Tablets 100mg

★中文商品名："永信"安樂普利諾錠

★醫師為何開此藥？

痛風症、痛風性關節炎、尿酸結石、癌症或經化學治療產生之高尿酸血症。

★如何使用此藥？

1. 本藥是口服錠劑，通常一天服用一次，飯後服用。請配合醫師指示服藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。此藥在一開始使用的 6~12 個月中可能會增加痛風發作的頻率，可併服 colchicine 以降低此現象。
2. 服藥期間建議每日至少 10~12 杯水份(約 2.5~3 公升)的補充，除非醫師另有其他指示或建議。
3. 若忘記服藥，則於想起時儘快服用；若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。切記不可一次服用雙倍的藥量。

★使用此藥時該注意什麼？

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對 Allopurinol 或其他藥物有過敏反應。
2. 請告訴醫師或藥師，您正在服用的藥物（包含非處方藥）。
3. 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過的疾病，如：腎臟疾病等等。
4. 服用此藥期間如需服用其它藥品時，請主動告訴您的醫師或藥師。
5. 此藥並不能減緩痛風之急性發作。
6. 腎衰竭或腎功能不良之病人，本品可能發生蓄積，或產生過敏反應。
7. 服藥後，請勿開車或操作危險機械及從事需要集中注意力的工作。
8. 長期使用本品，有必要時請配合醫師定期的抽血檢查，以確定療效或副作用發生。
9. 服藥期間請勿飲酒，它可能增加尿酸濃度並減低藥物治療效果。
10. 大量服用維生素 C 或氯化銨可能會增加腎結石生成之潛在性，故需特別小心。
11. 孕婦用藥等級：C。如果您準備懷孕或已懷孕，應告知並與您的醫師討論；計劃授乳的婦女，請於開始服藥前告知您的醫師或藥師。
12. 請將本藥物連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿冷藏或冷凍。請勿放在孩童可以取得的場所。

★此藥品可能引起的副作用及處理方式：

1. 若有以下症狀發生嚴重的情形或是無法消除時，請盡快告知您的醫師：胃不舒服、嘔吐、腹瀉、消化不良（脹氣）、嗜睡、頭痛。
2. 若您有下列任一症狀，請立刻通知醫師：皮膚紅疹、排尿疼痛、血便／血尿、出血瘀血不止、眼睛刺痛（發炎）、無原因虛弱、黃疸、嘴巴或嘴唇腫等。