Alprazolam 用藥指導單張

★英文商品名：Alprazolam Tablets 0.5mg "CYH" 【Xanax】

★中文商品名：安邦錠 0.5 毫克【第四級管制藥品】

★醫師為何開此藥？

焦慮狀態。

★如何使用此藥？

1. 請遵照醫師指示服用藥物，不可突然停藥，迅速減量或突然停藥可能會發生禁斷症狀發生。
2. 長期服藥後，若覺得效果不如前，請告知醫師，由醫師為您調整藥量，勿自行增加藥量或服藥次數。

★使用此藥時該注意什麼？

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對 Alprazolam 或其他藥物有過敏反應。
2. 請告訴醫師或藥師，您正在服用的藥物（包含非處方藥），特別是巴比妥類藥物、鴉片類藥物、抗黴菌藥品、BZD 拮抗劑 flumazenil。
3. 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過的疾病，如：腎臟疾病等等。
4. 服用此藥期間如需服用其它藥品時，請主動告訴您的醫師或藥師。
5. 若您將進行手術（包含牙科手術），請告訴醫師或牙醫師您正使用的藥物。
6. 服藥後，請勿開車或操作危險機械及從事需要集中注意力的工作。
7. 兒童對本藥較敏感，服藥期間應密切注意。
8. 老年人對本藥較敏感，可能會增加副作用（如昏昏欲睡、警覺性降低、頭暈、腳步笨拙或不穩）的機會，服藥期間應密切注意。
9. 本藥會與抗黴菌藥（Itraconazole、Ketoconazole）有相互影響，請務必與醫師或藥師充分討論後再服用。
10. 服藥時，請勿與含酒精的飲料併服。
11. 咖啡因會減低本藥的鎮靜與抗焦慮效果，服用本藥期間宜減少咖啡之攝取。
12. 服藥期間請避免吃葡萄柚（汁），可能會降低此藥藥效。

★此藥品可能引起的副作用及處理方式：

1. 常見副作用為虛弱、頭暈、嗜睡、不穩、疲倦，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
2. 若出現下列症狀時，請盡速就醫：話多、坐立不安或興奮、焦慮、亢奮、發抖、肌肉痙攣、意識不清、癲癇、皮膚或眼球變黃、步履蹣跚、持續微細顫抖或是不能靜坐、發燒、呼吸或吞嚥困難、嚴重皮膚紅疹、皮膚或眼睛發黃、心律不整。

此用藥指導單張並未包含本藥品所有資訊，若您仍有疑問，請詢問您的醫師或藥師。
中正脊椎骨科醫院藥劑科製作(114.06.07)

★忘記服藥時該怎麼辦：

若忘記服藥，則於想起時儘快服用；如果一天服藥超過兩次以上，若距離下次服藥時間少於4小時，則不需要補服，按原時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

★懷孕或哺乳時該怎麼辦：

孕婦用藥等級：D。如果您準備懷孕或已懷孕，應告知並與您的醫師討論。不建議於授乳期間使用本品，最好能改用其它的乳製品以取代母乳。

★如何保存藥品？

1. 請將本藥物連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿冷藏或冷凍。
2. 請勿放在孩童可以取得的場所。

中正脊骨神經科醫院