制酸劑藥品用藥指導單張

成分	英文商品名	中文商品名	含量
Magnesium Oxide	Magnesium Oxide Tab.	氧化鎂 250 毫克	250 毫克／錠
Alumium Dihydroxyallantoinate (Aldioxa)	Alusa Tab.	樂胃爽錠	100 毫克／錠

★醫師為何開此藥?

制酸劑俗稱胃藥，以內含鋁或（及）鎂之化合物為主，主要利用其中和胃酸的能力，用以緩解或預防因為胃酸過多所引起的心口灼熱感、胃脹氣或消化不良的症狀，也可用來治療或預防潰瘍的發生。

★如何使用此藥?

請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。一般建議於飯後一小時內服用，可維持約三小時之藥效。

★使用此藥時該注意什麼?

1. 請告訴醫師或藥師，您是否有藥物過敏反應、目前或曾有過的疾病。
2. 請告訴醫師或藥師，您正在服用的藥物（包含非處方藥）。
3. 服用此藥期間如需服用其它藥品時，請主動告訴您的醫師或藥師。
4. 服用含鎂制酸劑可能造成腹瀉；含鋁制酸劑則可能造成便秘。
5. 制酸劑會影響許多藥品之吸收，可能造成藥品作用降低或使病情失控，如：強心劑、抗生素（如抗黴菌劑）、鐵劑及某些抗潰瘍劑，如無法避免併服時，應先服用其它藥品，於二小時後再服用胃藥，或者詢問醫師或藥師。
6. 請將本藥物連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿冷藏或冷凍。請勿放在孩童可以取得的場所。

★此藥品可能引起的副作用及處理方式：

1. 可能產生腹瀉、便秘、食慾、減低噁心、嘔吐、頭痛、腹痛、大便顏色改變等副作用。若症狀持續數日或嚴重時，請停藥並立即就醫或與醫師連絡。
2. 當您發生下列症狀時，請與您的醫師聯絡：低血壓、不規則心跳、極度虛弱或倦怠、嚴重胃痛、情緒改變、肌肉痛等。

★忘記服藥時該怎麼辦：

若忘記服藥，則於想起時儘快服用；如果一天服藥超過兩次以上，若距離下次服藥時間少於 4 小時，則不需要補服，按原時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

★懷孕或哺乳時該怎麼辦：

在正常情況下，鎂與鋁離子幾乎不吸收，僅停留在腸胃道再從糞便排出，安全性較高，如經醫師評估後須使用，可適用於孕婦。計劃授乳的婦女，請於開始服藥前告知您的醫師或藥師。

中正脊椎骨科醫院