

Amoxicillin 用藥指導單張

★商品名：Amoxicillin Cap. 250mg / 安謀黴素膠囊 250 毫克

★商品名：Amoxicillin Cap. 500mg / 安謀黴素膠囊 500 毫克

★醫師為何開此藥？

Amoxicillin 是青黴素類抗生素，可用來治療肺炎、支氣管炎、花柳病、及耳朵、肺、鼻子、皮膚及泌尿道的細菌感染。此藥也可用在某些外科或牙科手術前，作為預防感染用途。抗生素對一般感冒、流行性感冒或其他病毒感染則無效。此藥也可能用於治療其他病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

★如何使用此藥？

本藥約需數天才能發揮療效，請遵照醫師與藥師指示服用，不可自行增減藥量、更改用法或停藥。

★使用此藥時該注意什麼？

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對 Amoxicillin、Penicillin 或其他藥物有過敏的反應。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物（包含非處方藥），特別是其他抗生素、Allopurinol、抗凝血劑（如：Warfarin）、口服避孕藥、Probenecid 等。
3. 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過的疾病，特別是有花粉熱、蕁麻疹、氣喘、苯酮尿症、胃腸、腎臟等疾病，請告知醫師。
4. 本藥會與四環素類抗生素、免疫抑制劑（Methotrexate）等藥品有相互影響，請務必與醫師或藥師充分討論後再服用。
5. 如果您將進行其他的醫療檢驗，請事先告知醫師您正在服用本藥，以免影響檢驗結果。
6. 本藥可能會降低口服避孕藥的效果，請採取其他避孕方式。
7. 糖尿病患服本藥期間，應密切留意血糖變化。若血糖控制不理想，應請教醫師。
8. 可能會造成維他命 K 缺乏症狀（低 Prothrombin 血症，出血傾向等），或維他命 B 群缺乏症狀（舌炎、口內炎、食慾不振、神經炎等）。對於高齡患者、衰弱患者及食慾不佳的患者更易引起此現象。

★此藥品可能引起的副作用及處理方式：

1. 服用本藥，若出現發燒，頭暈，臉浮腫，呼吸不規則，皮膚紅疹、蕁麻疹或皮膚癢，關節痛，請立即停藥並馬上就醫。
2. 服用本藥，若出現抽搐，心情鬱卒，異常疲倦，缺乏體力，眼睛或皮膚變黃，喉嚨痛，噁心、嘔吐，腹部或胃痙攣、疼痛，膚色蒼白，異常出血或瘀青，水瀉或血便，尿量減少，請立即與醫師或藥師聯絡。
3. 服藥後，若出現嚴重腹瀉，在未與醫師充分討論前，請勿自行服用止瀉藥。

4. 服藥後，若感染症狀數日內仍未改善或更嚴重，請務必與醫師聯絡。

★忘記服藥時該怎麼辦：

想起時，立即服用；若已接近或已到下一次服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

★懷孕或哺乳時該怎麼辦：

如果您準備懷孕或已懷孕，應告知並與您的醫師討論；計劃授乳的婦女，請於開始服藥前告知您的醫師或藥師。

★如何保存藥品？

1. 請將本藥物連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿冷藏或冷凍。
2. 請勿放在孩童可以取得的場所。