

Amiodarone 用藥指導單張

★英文商品名：Amiorone Tablets (Amiodarone) 200mg 【高警訊藥品】

★中文商品名：艾歐隆錠 200 公絲(艾米達隆)

★醫師為何開此藥？

可以治療或預防心跳不規則及心律不整。

★如何使用此藥？

1. 請遵照醫師指示服用，不可自行停藥。
2. 服藥時，請勿與含葡萄柚汁的飲料併服。

★使用此藥時該注意什麼？

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對 Amiodarone 或其他藥物有過敏的反應。
2. 請告訴醫師或藥師，您正在服用的藥物（包含非處方藥）。
3. 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過的疾病。
4. 服用此藥期間如需服用其它藥品時，請主動告訴您的醫師或藥師。
5. 應避免抽煙及含酒精和咖啡因的飲料，以免刺激心臟。
6. 請定期回門診作血液、視力檢查、心電圖與胸腔 X 光的檢查，根據檢查結果，醫師可調整最適當的用藥劑量。
7. 使用本藥可能出現短暫性眩暈，當平躺坐起或起身站立時，宜放慢動作。且請勿開車或操作危險機械及從事需要集中注意力的工作。
8. 兒童對本藥較敏感，服藥期間應密切注意。
9. 老年人對本藥較敏感，可能會增加副作用（如走路困難，四肢發麻、刺痛或無力感）的機會，服藥期間應密切注意。
10. 接受任何手術或拔牙前，請告知醫師正在服用或最近兩個月內曾服用本藥。
11. 本藥具光敏感性，日曬後皮膚可能變藍紫色，停藥後亦難消失，故治療期間，應避免日曬，或採防曬措施。
12. 本藥會與抗精神病藥 (Thioridazine、Ziprasidone) 及抗病毒藥 (Amprenavir、Atazanavir、Indinavir、Lopinavir/ritonavir、Nelfinavir、Ritonavir、Saquinavir) 等藥品有相互影響，請務必與醫師或藥師充分討論後再服用。

★此藥品可能引起的副作用及處理方式：

1. 常見的副作用為：噁心、嘔吐、便秘、食慾不振、腹部疼痛、腹部腫脹等，常發生在開始服藥期間，且會隨著劑量降低或與食物併服而逐漸改善。
2. 服用本藥，若出現坐立不安，怕熱或畏寒，頭髮稀疏，視力模糊，畏光，眼睛痛，呼吸短促或疼痛，咳嗽，甲狀腺腫大，手發抖，皮膚紅疹，肌肉無力，下肢水腫，

此用藥指導單張並未包含本藥品所有資訊，若您仍有疑問，請詢問您的醫師或藥師。
中正脊椎骨科醫院藥劑科製作(114.03.14)

四肢發麻或無力，不自主運動，動作不協調或行動困難，月經週期改變，流汗量增加，體重改變，請立即與醫師或藥師聯絡。

★忘記服藥時該怎麼辦：

想起時，立即服用；若已接近或已到下一次服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

★懷孕或哺乳時該怎麼辦：

本藥可能會傷害您未出生的胎兒，懷孕婦女不建議使用。不建議於授乳期間使用本品，最好能改用其它的乳製品以取代母乳。

★如何保存藥品？

1. 請將本藥物連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿冷藏或冷凍。
2. 請勿放在孩童可以取得的場所。