Clopidogrel 用藥指導單張

★**英文商品名**：★Clogrel Film Coated Tablets 75mg (Clopidogrel)【Plavix】

★**中文商品名**："信東"絡柔奎膜衣錠 75 毫克

★**醫師為何開此藥?**

可降低曾發生中風、心肌梗塞或週邊動脈血管疾病的病人再度發生動脈硬化事件。

★**如何使用此藥?**

請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。

★**使用此藥時該注意什麼?**

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對或其他藥物有過敏反應。
2. 請告訴醫師或藥師，您正在服用的藥物（包含非處方藥）。
3. 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過的疾病。
4. 服用此藥期間如需服用其它藥品時，請主動告訴您的醫師或藥師。
5. 服藥期間若接受外科手術（包括牙科手術），請事先告知醫師您正在服用此藥。
6. 本藥品不建議用於兒童或 18 歲以下的青少年。
7. 服用本藥品期間應避免喝酒，因酒精會增加引起胃出血機率。
8. 本藥有可能會引發出血問題，若正從事激烈運動而易導致受傷，應事先告知醫師。

★**此藥品可能引起的副作用及處理方式**：

1. 常見的副作用為：頭痛、頭昏、眩暈、腹瀉、噁心、胃部不適、皮膚紅疹、搔癢等。
2. 當您發生下列症狀時，請停藥並馬上和醫師聯絡：黑便、血便、吐血、不正常出血、流鼻血、嘔吐、呼吸困難等。

★**忘記服藥時該怎麼辦**：

忘記服藥時應立即補吃。若已經接近下一次服用時間，就不需補吃，並於下一次正確的時間服用一次的藥量。請不要服用雙倍的量，以免過量可能發生危險。

★**懷孕或哺乳時該怎麼辦**：

如果你準備懷孕或已懷孕，應告知並與你的醫師討論。不建議於授乳期間使用本品，最好能以其他乳製品以取代母乳。

★**如何保存藥品**？

1. 請將本藥物連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿冷藏或冷凍。
2. 請勿放在孩童可以取得的場所。

中正脊椎骨科醫院