

非類固醇抗發炎劑 (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents)

成分	英文商品名	中文商品名	含量
Acemetacin	Aceo Capsules Retard	痛立安長效膠囊	90 毫克／膠囊
Aceclofenac	Ascofen F.C. Tablets	炎立消膜衣錠	100 毫克／錠
Celecoxib	Celebrex Capsule	希樂葆膠囊公絲	200 毫克／膠囊
Diclofenac Potassium	Volna-K F.C. Tablets	待可服寧膜衣錠	50 毫克／錠
Diclofenac Sodium	Voren E.M. Cap.	非炎腸溶微粒膠囊	50 毫克／膠囊
	Voren – G Gel	非炎凝膠	40 克／軟管
Etodalac	Elac Capsules	易治炎膠囊	200 毫克／膠囊
Etoricoxib	Youkoxia F.C. Tab.	息樂炎膜衣錠	60 毫克／錠
Flurbiprofen	Fukon Tablets	福康錠	50 毫克／錠
	Flur DiFen Patch	富帝芬貼片	40 毫克／片
Indomethacin	Indoy Capsules	炎達益膠囊	25 毫克／膠囊
Ketorolac Tromethamine	Keto E. M. Cap.	克多炎腸溶微粒膠囊	100 毫克／膠囊
Mefenamic Acid	Ponstan Kapseals	博疏痛膠囊	250 毫克／膠囊
Meloxicam	Meloxin Tablets 7.5mg	美息炎錠 7.5 毫克	7.5 毫克／錠
Piroxicam	Focus Gel	伏加斯凝膠	40 克／軟管
Sulindac	Jolindac Tablets	舒止炎錠	200 毫克／錠
Tiaprofenic Acid	Sufen Tablets	舒菲錠	200 毫克／錠

★醫師為何開此藥？

此類藥為非類固醇的消炎止痛藥，主要用於止痛、消除發炎症狀、解熱。

★如何使用此藥？

1. 口服藥品請與大量開水併服。服藥後 15~30 分鐘內不可躺下。
2. 若胃腸不適，請飯後服用或併服制酸劑，以減少對腸胃的刺激。
3. 由於各個藥品作用時間長短不一，因此服藥間隔時間也不同。請確實遵照醫師處方服藥。
4. 長效錠（中文商品名中含有長效、緩釋、持續、持效等字樣）須整粒吞服，不可研磨或嚼碎使用。
5. 貼布請須依醫師處方使用，通常一日一次貼於患部，慢性病患者或重症者，一日可換貼 1~2 次，可切割成適當大小，剝去表面薄紙，貼於患部。
6. 若忘記服藥，則於想起時儘快服用；如果一天服藥超過兩次以上，若距離下次服藥時間少於 4 小時，則不需要補服，按原時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

★使用此藥時該注意什麼？

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對本藥或其他藥物（如：NSAIDs）有過敏反應。
2. 請告訴醫師或藥師，您正在服用的藥物（包含非處方藥），如：抗凝血劑（warfarin）。
3. 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過的疾病，如：胃潰瘍或十二指腸潰瘍等。
4. 服用此藥期間如需服用其它藥品時，請主動告訴您的醫師或藥師。
5. 若您將進行手術（包含牙科手術），請告訴醫師或牙醫師您正使用的藥物。
6. 服用此類藥品，可能會增加心血管疾病（心臟病發作、中風）的風險，且可能造成嚴重危及生命的消化道出血，請務必與醫師或藥師充分討論後再服用。
7. 會引起頭暈目眩及視覺模糊的副作用，尤其是剛開始服藥期間，除非已經適應了此藥的作用，當開車或操作危險機械時，應該格外小心謹慎。
8. 本藥有可能會遮蔽感染症狀，使用本藥於感染性疾病者，需小心謹慎。
9. 建議服藥期間不要飲用含酒精飲品，因酒精易引起頭痛、胃出血的副作用產生。
10. 使用本類藥品前或使用期間，醫師可能會處方監測血球計數、肝／腎功能、糞便潛血反應等檢驗，請確實依照醫師指示完成檢驗。
11. 風濕疾病的治療，通常在一至二周後方見效，請按時服藥。
12. 使用外用乳膏／貼布，須避開傷口或感染部位。
13. 使用外用貼布時，先將患部汗水擦乾再予貼上。於關節等易脫落之部位，可用護膠或伸縮繃帶固定。
14. 如果您準備懷孕或已經懷孕或需餵哺母乳，請告知您的醫師或藥師。
15. 請將本藥物連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿冷藏或冷凍。

★此藥品可能引起的副作用及處理方式：

1. 如果下列情形持續發生且症狀嚴重時，請告訴您的醫師：頭暈或暈眩、胃部不適、腹脹、噁心或嘔吐、皮膚出疹、腹瀉或便秘等副作用。
2. 當您發生下列症狀時，請馬上和醫師聯絡：異常疲倦或頭暈、頭昏眼花、嚴重腹部或胃灼熱或絞痛、食慾不振、噁心或嘔吐、吐血、黑便或血便、耳鳴、四肢水腫、眼睛或皮膚變黃等。
3. 當您發生下列症狀時，請停藥立刻至急診就醫：過敏反應（如嘴唇或眼睛腫脹、皮膚紅疹、搔癢或蕁麻疹、心跳快速或心跳不規則、呼吸異常或困難、哮喘或呼吸困難等）。